

**COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

YORBEAU INTERCEPTE 14,0 g/t Au SUR 2,0 MÈTRES À LA PROPRIÉTÉ ROUYN

Montréal, le 18 décembre 2014 – Les Ressources Yorbeau Inc. (la « Compagnie » ou « Yorbeau ») (TSX: YRB.A) est heureuse de fournir une mise à jour sur son récent programme de forage à la propriété Rouyn.

Le programme de forage a inclus sept sondages totalisant 3 070 mètres. Le forage s'est concentré sur une distance de 2 km sur la faille Cadillac et le Groupe de Piché situés entre la limite est du gîte Astoria et la structure prolifique Smokey Creek à laquelle plusieurs producteurs aurifères sont associés (mines Stadacona, Senator, Silidor et Elder). Le forage historique dans ce secteur a été très limité et restreint à des niveaux peu profonds.

Le programme visait la minéralisation aurifère associée à la faille Cadillac et le Groupe de Piché à des profondeurs variant de 200 à 400 mètres. Les objectifs spécifiques du programme incluaient de tester la limite de la nouvelle zone aurifère découverte en mai 2014 (9,1 g/t Au sur 9,0 mètres dans le forage AS-14-645, communiqué de presse du 8 juillet 2014) et deux forages devant tester les roches ultramafiques du Groupe de Piché et les sédiments Timiskaming près de l'intersection entre la faille Cadillac et la faille Smokey Creek. Les résultats d'analyse du programme sont les suivants :

Trou de forage	De	À	Longueur de carotte (m)	Teneur Au (g/t)	Commentaires
AS-14-646	260,0	262,0	2,0	14,0	Or visible, Groupe de Piché
AS-14-647	386,6	387,6	1,0	2,7	Piché
AS-14-648	325,0	326,2	1,2	0,8	Piché
	443,3	445,0	1,7	0,6	Sédiments (FWZ)
AS-14-649	Aucun résultat significatif				
AS-14-650	332,0	336,0	4,0	0,6	Sédiments (FWZ)
BO-14-651	376,5	378,0	1,5	2,8	Piché près de la faille Smokey Creek
	385,0	387,0	2,0	1,4	Sédiments (FWZ)
	461,6	462,6	1,0	1,1	Sédiments (FWZ)
BO-14-652	292,5	293,5	1,0	2,7	Seds (près de la faille Smokey Creek)
	393,0	394,2	1,2	1,5	tel que ci-dessus
	445,8	446,8	1,0	3,5	tel que ci-dessus
	454,0	455,0	1,0	0,6	tel que ci-dessus
	465,7	466,7	1,0	1,8	tel que ci-dessus

L'épaisseur vraie ne peut être mesurée avec certitude dans les forages précités mais il est estimé qu'elle représente 70 % de la longueur de la carotte.

Les résultats obtenus dans les forages AS-14-646 (**14,0 g/t Au sur 2,0 mètres**) et AS-14-647 (**2,7 g/t Au sur 1,0 mètre**) indiquent que la minéralisation dans le forage AS-14-645 s'étend à l'est sur une distance d'au moins 130 mètres et que la minéralisation aurifère à l'est de l'ancien puits se poursuit en profondeur jusqu'à 400 mètres (voir la longitudinale ci-jointe). Les autres forages ont confirmé la présence du Groupe de Piché et ont des valeurs aurifères sporadiques sur au moins 2 km à l'est de la zone aurifère Astoria. De plus, un membre basaltique a maintenant été formellement identifié dans le Groupe de Piché à l'est d'Astoria. Ceci est une découverte importante pour l'exploration future dans ce secteur puisque, par analogie avec la mine Kerr Addison de réputation mondiale située à 42 km à l'ouest, ces roches semblent avoir un meilleur potentiel pour la minéralisation aurifère en raison de leur contenu de fer plus élevé. Des intersections aurifères sporadiques encourageantes dans les sédiments du Groupe Timiskaming (**2,7 g/t Au sur 1,0 mètre** et **3,5 g/t Au sur 1,0 mètre**) ont également été recoupées dans le forage AS-14-652 près de la faille Smokey Creek. Des travaux additionnels devront être effectués pour évaluer toute la signification de ces intersections.

Le nouvel examen de la description des carottes des forages historiques (1986 et 1995) dans le secteur Astoria a continué durant l'automne et a mené à la reconnaissance de zones minéralisées qui n'avaient pas été antérieurement échantillonnées. Les résultats d'analyse du récent échantillonnage des anciennes carottes sont encourageants et sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Trou de forage	De	À	Longueur de la carotte (m)	Teneur Au (g/t)	Commentaires
AS95-9043	87,4	91,5	4,1	2,6	Sédiments (HWZ)
AS95-7034	77,0	81,0	4,0	0,8	Piché
	125,5	128,6	3,1	0,7	
AS95-9031A	25,0	29,0	4,0	4,8	Piché
incluant	25,0	27,0	2,0	9,0	
AS95-9040	21,0	26,9	5,9	0,5	Sédiments (FWZ)
AS95-9047	29,0	35,0	6,0	1,0	FWZ
AS95-10022	168,0	176,0	8,0	1,1	Piché
	186,0	190,0	4,0	0,5	Piché
AS95-9034	7,5	12,0	4,5	1,8	FWZ
	20,0	22,0	2,0	0,8	FWZ
	28,6	29,6	1,0	2,9	FWZ
AS86-232	268,0	269,0	1,0	0,5	FWZ

La plupart des trous de forages proviennent du forage souterrain effectué à des angles qui varient considérablement et la longueur mesurée des carottes peut ne pas représenter l'épaisseur vraie des zones minéralisées. Néanmoins, les résultats encourageants ci-dessus supportent définitivement la poursuite de d'un nouvel examen des forages historiques.

Finalement, les affleurements situés près de la faille Smokey Creek ont été examinés et échantillonnés. Plus particulièrement, un affleurement de sédiments Timiskaming bien minéralisés avec des sulfures (8 % de sulfures) a rapporté des analyses fortement anormales en or, s'élevant jusqu'à 0,7 g/t Au. Cette minéralisation est possiblement reliée à la faille Smokey Creek et augure bien pour une anomalie par polarisation provoquée (encore non testée) située dans un environnement similaire à 350 mètres au sud.

Gérald Riverin, géo. et président, a déclaré « Cette première étape de forage dans une région antérieurement inexplorée a fourni des données techniques nécessaires qui seront intégrées dans la base de données de la Compagnie afin de guider les travaux de suivi sur la propriété Rouyn. Plus particulièrement, nous sommes heureux du forage AS-14-646 qui confirme la présence locale d'une minéralisation aurifère à teneur élevée à l'est d'Astoria. Notre équipe d'exploration continue de consolider l'information de ces travaux et nous attendons avec impatience la prochaine étape des travaux. »

La personne qualifiée en vertu du règlement 43-101 est Laurent Hallé, géo., qui a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué.

Les échantillons ont été analysés au laboratoire ALS Chemex à Sudbury (Ontario) par pyro-analyse suivi de la méthode d'absorption atomique et de gravimétrie. Le programme d'échantillonnage et d'analyse a fait l'objet du programme d'assurance et du contrôle de la qualité de Yorbeau qui consiste à insérer des blancs et standards aurifères dans les lots d'échantillons envoyés au laboratoire d'analyse.

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Compagnie contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources.

Des renseignements additionnels concernant la Compagnie sont disponibles sur le site web de la Compagnie au www.yorbeauresources.com. La raison d'être de Yorbeau est d'identifier un gisement aurifère de classe mondiale dans un camp minier important.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Gérald Riverin, géo. Ph.D.
Président
Les Ressources Yorbeau Inc.
griverin@yorbeauresources.com
Tél. : 819-279-1336

G. Bodnar jr
Administrateur
Les Ressources Yorbeau Inc.
gbodnar@yorbeauresources.com
Tél. : 514-384-2202
Sans frais en Amérique du Nord : 1-855-384-2202

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

ASTORIA

EAST-BAY

BOUZAN

Surface

AS-14-645
9.1/9.0m
2.7/3.0m

AS-14-646
14.0/2.0m

AS-14-648
0.8/1.2m
(0.6/1.7m)

AS-14-647
2.7/1.0m

AS-14-649
barren

AS-14-650
barren
(0.6/4.0m)

BO-14-651
2.8/1.5m
(1.4/2.0m)
(1.1/1.0m)

BO-14-652
barren

(2.7/1.0m)
BO-14-652
Seds(FWZ)
(1.5/1.2m)
(3.5/1.0m)
(1.8/1.0m)

-200m

-400m

-600m

-800m

-1000m

-1200m

Vertical longitudinal looking North

Grade thickness contours



Hole number

● g/t/m Au: mineralisation in the Piché Group *
(g/t/m) Au: mineralisation in the Timiskaming sediments *

* Core length

0 200m

Faille Smokey Creek
(position possible)

6 800E

7 000E

7 200E

7 400E

7 600E

7 800E

8 000E

8 200E

8 400E

8 600E

8 800E

9 000E

9 200E